

## **Il consenso informato all' intervento di ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE**

È importante sottolineare la necessità di collaborazione attiva del paziente e l'osservanza scrupolosa delle direttive pre e post operatorie infrascritte, allo scopo di ridurre la possibilità di insorgenza di complicazioni peri e post operatorie.

### **Istruzioni preoperatorie**

Organizzarsi per arrivare almeno 30 minuti prima dell'ora programmata per il suo intervento a meno che sia stata istruita diversamente.

Se pernoverà in un albergo vicino al luogo di cura o se ha programmato di tornare a casa deve comunque provvedere personalmente al suo trasporto . E inoltre consigliato che la persona responsabile del suo trasporto rimanga nei dintorni durante il periodo operatorio.

Non mangiare ne bere niente dopo la mezzanotte del giorno precedente l'operazione. Se l'intervento è programmato dopo le ore 13 può consumare una leggera colazione prima delle 8 dello stesso giorno a base di tè o caffè e fette biscottate e poi digiuno totale fino all'ora dell'intervento.

Tutti i nostri interventi sono generalmente eseguiti sotto anestesia locale a base di xilocaina e adrenalina. Non viene somministrata anestesia generale. È tuttavia possibile talora la somministrazione di farmaci per via endovenosa per aumentare il confort operatorio per il paziente.

Programmare di stare lontano dal lavoro per un periodo variabile dai 2-3 giorni alle 2 settimane a seconda dell'intervento cui si viene sottoposti.

Se vi ammalate o sviluppate febbre nei giorni o nel giorno precedente l'intervento chirurgico dovete notificarcelo prima possibile.

Il giorno dell'intervento non utilizzare nessun tipo di trucco su viso e unghie. Vestitevi casual e con abiti non aderenti che non forzino al passaggio attraverso la testa.

Dopo l'intervento chirurgico potrete mangiare qualche alimento leggero come crackers con acqua che quindi sarebbe consigliabile portare con se.

È richiesta la presenza di un responsabile adulto che vi fornisca assistenza e che vi guidi a casa dal luogo della chirurgia e che stia con voi per le 24 ore che seguono l'intervento chirurgico. Nel caso siate impossibilitati a reperire tale responsabile per la vostra persona , facendocene richiesta con un anticipo di almeno una settimana potremo provvedere ad organizzarvi una notte con infermiera in albergo o nella struttura nella quale siete stati operati.

Se assumete regolarmente medicine, rendetecene conto e continuate ad assumerle anche il giorno dell'intervento con un piccolo sorso di acqua specialmente se medicine antiipertensive, salvo diverse istruzioni da parte nostra.

### **Prima di ogni intervento chirurgico**

È consigliato ma non tassativo non assumere per almeno un mese prima di ogni intervento chirurgico vitamina E , Aglio, Prodotti per dimagrire, Aspirina o prodotti contenenti Aspirina in quanto possono aumentare il rischio di sanguinamenti e sospendere il fumo almeno tre settimane prima in quanto correlato con ritardo di guarigione delle ferite chirurgiche e qualità delle cicatrici.

## Prodotti contenenti Aspirina e Ibuprofen:

Alka Seltzer    Ascriptin    Aspegic    Aspro    Bufferin    Cemirit    Flectadol  
NeoCibalgina    Vivin C    Via mal    Brufen    Moment

Altri farmaci controindicati:

Feldene    Orudis    Naprosyn    Voltaren

I farmaci sopracitati sono quelli di più comune uso, ma numerosi altri controindicano l'esecuzione di un intervento chirurgico se non sospesi per un tempo adeguato prima dell'intervento chirurgico, è pertanto importante riferire della assunzione di qualsiasi tipo di farmaco nelle ultime quattro settimane nonché di eventuali allergie già riscontrate in passato in seguito alla assunzione di farmaci.

È consigliata l'assunzione di vit. C a partire da una settimana prima dell'intervento 1 grammo per due al giorno divisi in mattina e sera che aiuta a diminuire il gonfiore e le ecchimosi postoperatorie.

## Istruzioni post-operatorie

È possibile che proviate del disagio e dolore durante le prime 24-48 ore dopo l'intervento e per questo vi saranno prescritti dei farmaci per tenere sotto controllo il dolore, da assumere preferibilmente a stomaco pieno. Non assumere aspirina o nessuno dei farmaci descritti nelle istruzioni preoperatorie in quanto possono causare sanguinamento.

Potrete osservare gonfiore ed ecchimosi ; ciò è normale e non deve allarmarvi.

È possibile che durante l'intervento chirurgico il chirurgo abbia ritenuto necessario inserire dei drenaggi . Ciò aiuta eventuali secrezioni sierose ed ematiche a fuoriuscire e vengono rimossi generalmente dopo uno o due giorni post operatori salvo complicazioni.

La medicazione subito dopo l'intervento consisterà in un sistema di fasciatura contenitiva e compressiva che non dovrà essere rimossa dal paziente per nessun motivo salvo diversa indicazione del chirurgo. È possibile osservare la modesta fuoriuscita di materiale sanguinolento lungo le linee di sutura per le prime 24/48 ore; ciò è normale e non vi deve allarmare.

È consigliabile non fumare per almeno sette giorni dopo l'intervento . Il fumo ritarda i processi di guarigione delle ferite.

Al minimo dubbio di andamento anormale del periodo post operatorio o per altri problemi inerenti l'intervento consultate senza esitazione il vostro chirurgo.

## Degenza

L'intervento di asportazione di Neoformazione Cutanea viene eseguito in regime di chirurgia ambulatoriale senza ricovero o con un giorno di ricovero a seconda dei casi ; in seguito ad eventuali complicazioni intraoperatorie o nell'immediato periodo post operatorio è possibile che il vostro chirurgo consigli nel vostro interesse di prolungare il periodo di degenza o addirittura di ritornare in sala operatoria ; tali eventualità determineranno un aumento delle spese totali a carico del paziente relative all'intervento chirurgico rispetto a quanto pattuito in sede preoperatoria .

Il/La sottoscritto/a Sig. ....intende sottoporsi ad intervento chirurgico di asportazione di neoformazione cutanea e pertanto richiede la suddetta prestazione professionale al Dr. Marcus Mascetti che accetta e che con la presente scrittura informa che l'intervento chirurgico di asportazione di neoformazione cutanea consiste nella incisione chirurgica ellittica o rettilinea della cute circostante la neoformazione e la sua asportazione, seguita da una sutura estetica della ferita chirurgica.

Nel caso specifico la neoformazione è localizzata.....

.....Tale intervento chirurgico viene eseguito attraverso una incisione (a cui residuerà inevitabilmente una cicatrice) delle dimensioni di circa un quarto superiori alla neoformazione .

I rischi connessi a tale tipo di procedura chirurgica sono rappresentati da :

1. diminuzione della sensibilità della cute in corrispondenza della nuova cicatrice
2. infezioni, infiammazioni, ecchimosi ed ematomi
3. rischi connessi all'uso di farmaci anestetici
4. cicatrizzazione patologica
5. Discromie cutanee
6. Lesioni Nervose sensitive e/o motorie

La Paziente si impegna ad assumere l'antibiotico come da prescrizione dei Sigg. Medici. Ho avuto possibilità di porre domande ed a tutte queste mi è stato risposto in modo esauriente e completo. Sono consapevole che nel corso dei procedimenti in questione si possono manifestare condizioni impreviste che possono necessitare di procedure diverse da quelle contemplate ; acconsento, pertanto, ad eventuali ulteriori interventi terapeutici che i Sigg. Medici ritengano necessari.

I contenuti del suddetto consenso sono stati già precedentemente discussi verbalmente durante una o più visite pre operatorie eseguite almeno dieci giorni prima dell'intervento. Letto quanto sopra descritto alle pagine 3,4 dopo esser consapevolmente informato il richiedente consente ad essere sottoposto al suddetto intervento chirurgico.

Data     /     /

Sottoscrizione del paziente

\_\_\_\_\_

Sottoscrizione del Medico Chirurgo

\_\_\_\_\_

